


拜瑞妥®(Rivaroxaban, Xarelto®)使用須知

◆臨床用途

拜瑞妥為一種預防血栓(血塊)的用藥，屬於抗凝血劑，用來預防危險的血栓(血塊)形成。

◎正常的血管 ◎血栓阻塞的血管



◆就醫時須告知醫師事項

如果有下列事項，請告知醫師：

- ◇有肝腎疾病者、曾有胃潰瘍病史、曾有凝血功能障礙或出血問題病患。
- ◇孕婦/哺乳或有計畫懷孕/哺乳的婦女。
- ◇有新用或停用任何藥物時。
- ◇有自行服用中藥、草藥、健康食品等。
- ◇接受任何治療(手術、拔牙或侵入性檢查)時應先告訴醫師：
我正在服用抗凝血劑“拜瑞妥”！

◆安全服藥法則

怎麼吃藥？

- ◇請依照醫師處方之藥量服用。
- ◇必須**飯中**服用，有較好的藥效。

小叮嚀：飯中使用表示服藥後立即用餐或用餐後立即服藥。

- ◇服藥期間，避免大量攝取葡萄柚或喝含葡萄柚汁的飲料。

忘記吃藥怎麼辦？

- ◇如果在原服藥時間的12小時內想起來，則盡速服用。
- ◇若已接近或已到下一次服藥時間，只需服用當次藥量，**切勿服用雙倍藥量。**

注意事項：

- ◇請按照醫師指示**定時定量服藥**，不可任意增減劑量或停藥。
- ◇避免從事危險或易受傷的運動，當發生嚴重跌倒或頭部撞擊時，請立即就醫。
- ◇注意觀察出血或血栓症狀。

哪些可能是出血的訊號？

- ◇牙齦出血
- ◇突然流鼻血
- ◇經血過多(異於平常)
- ◇紅色或暗褐色尿液
- ◇解黑便或血便
- ◇不明原因的異常瘀傷
- ◇咳血或嘔吐物帶血(咖啡狀)
- ◇嚴重頭痛

出現下列疑似血栓症狀時，應立即就醫。

- ◇突然手或腳無力
- ◇突然口齒不清或無法說話
- ◇頭暈
- ◇身體麻木或刺痛感
- ◇視覺異常或喪失視力
- ◇新發生的四肢腫脹或疼痛
- ◇呼吸短促、胸痛或咳血



◆本藥可能會引起哪些副作用？發生了該怎麼辦？

| | 副作用症狀 | 如何處理 |
|----|--|--------------------------------|
| 少見 | 腸胃出血、血尿、牙齦出血、解黑便或血便、經血過多(異於平常)、不明原因的異常瘀傷、咳血或嘔吐物帶咖啡色、嚴重頭痛 | 儘快與醫師或藥師聯絡或立即就醫 |
| 罕見 | 過敏反應(包括蕁麻疹、皮疹與搔癢)、胸痛、胸悶、臉部腫脹、呼吸困難或喘鳴、感到昏厥 | |
| 少見 | 便秘、腹瀉、腹痛、噁心、貧血、背痛、周邊水腫、傷口腫脹或分泌物異常、肌肉無力 | 可於回診時告知醫師，但症狀嚴重或持續時，請先與醫師或藥師聯絡 |

小叮嚀：副作用不一定會發生，或是有可能症狀輕微，若有疑問請諮詢醫師或藥師。